

## Dénomination du médicament

**NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose**  
**Povidone**

## Encadré

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours de traitement.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?
3. Comment utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Autres médicaments ophtalmologiques - code ATC : S01XA20.

NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose contient de la povidone. Ce composant remplace et joue le même rôle que les larmes.

Ce médicament est utilisé pour traiter la sécheresse de l'œil (traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours de traitement.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?

**N'utilisez jamais NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose :**

- si vous êtes allergique à la povidone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans [la rubrique 6](#).
- EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose.

Faites attention avec NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose :

- N'avez pas et n'injectez pas ce médicament.
- Lavez-vous soigneusement les mains avant l'application.
- Evitez le contact de l'embout avec les paupières et ne touchez pas votre œil avec l'extrémité du flacon pour éviter le risque de contamination du collyre et de blessure à l'œil.
- Ce collyre est présenté en flacon à usage unique (unidose) et ne contient pas de conservateur. **L'unidose doit être jetée immédiatement après usage et ne doit pas être conservée en vue d'une utilisation ultérieure.**
- Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin.
- Si vous devez utiliser un autre collyre, attendez 15 minutes entre les deux applications. **NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose doit toujours être appliqué en dernier.**

**En cas d'apparition de céphalées, de douleur aux yeux, de troubles de la vision, d'irritation des yeux, de rougeurs persistantes, ou encore si les symptômes persistent ou s'aggravent, arrêtez immédiatement votre traitement par NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose et consultez votre médecin.**

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

**Autres médicaments et NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

**NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose avec des aliments et boissons**

Sans objet.

## **Grossesse et allaitement**

### **Grossesse**

L'utilisation de NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose peut être envisagée au cours de la grossesse, si nécessaire.

### **Allaitement**

L'utilisation de NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose peut être envisagée chez la femme en période d'allaitement, si nécessaire.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Une vision trouble peut affecter l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Dans ce cas, attendez le rétablissement d'une vision normale avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

#### **NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose contient**

Sans objet.

### **3. COMMENT UTILISER NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### **Posologie et fréquence d'administration**

#### **Adultes (y compris les personnes âgées)**

Appliquez 1 goutte de collyre, 4 fois par jour ou selon la prescription en fonction de la gravité des symptômes.

Appliquez 1 goutte de collyre lorsque les troubles oculaires (sécheresse, brûlures, démangeaisons) se font sentir.

#### **Utilisation chez les enfants**

L'utilisation de ce collyre n'est pas recommandée chez l'enfant.

### **Mode d'administration**

Voie locale (voie ophtalmique).

EN INSTILLATION OCULAIRE UNIQUEMENT.

Lors de l'utilisation de ce collyre, veuillez respecter les étapes suivantes :

1. Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler le collyre.
2. Détachez et ouvrez l'unidose en tournant le bouchon.
3. Evitez le contact de l'embout de l'unidose avec l'œil ou les paupières, pour éviter le risque de contamination du collyre et de blessure à l'œil.
4. Tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas en regardant en haut.
5. Déposez une goutte de collyre dans l'espace formé.
6. Jetez l'unidose immédiatement après utilisation.
7. Après ouverture, ne conservez pas l'unidose pour une administration ultérieure.

Si la goutte de collyre tombe à côté de votre œil, réessayez.

Si vous utilisez d'autres collyres ou pommades ophtalmiques, attendez au moins 15 minutes entre chaque instillation de produit. Les pommades ophtalmiques doivent être appliquées en dernier.

#### **Si vous avez utilisé plus de NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose que vous n'auriez dû**

Aucun effet indésirable n'est attendu.

#### **Si vous oubliez d'utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose**

Sans objet.

#### **Si vous arrêtez d'utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants, pour lesquels la fréquence est inconnue (ne peut pas être estimée selon les données disponibles), ont été rapportés suite à l'utilisation de NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose :

### **Affections oculaires**

*Fréquence indéterminée* : vision trouble, douleur oculaire, démangeaisons oculaires, irritation oculaire, sensation anormale au niveau de l'œil, rougeur au niveau de l'œil (hyperémie oculaire), sensation transitoire de brûlure ou de paupières collées.

### **Affections du système immunitaire**

*Fréquence indéterminée* : réactions d'irritation, réactions allergiques au médicament (hypersensibilité).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

Jeter après usage.

Ne pas conserver après ouverture.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**Ce que contient NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose**

Povidone.....	20,00 mg
---------------	----------

Pour un récipient unidose.

Acide borique, chlorure de sodium, lactate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Ce médicament se présente sous forme de collyre.  
Boîte de 5, 10, 20, 30 ou 100 récipients unidoses.  
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**LABORATOIRES ALCON**  
20 rue des deux gares  
92500 RUEIL-MALMAISON

**LABORATOIRES ALCON**  
20 rue des deux gares  
92500 RUEIL-MALMAISON

**EXCELVISION**  
RUE DE LA LOMBARDIERE  
07100 ANNONAY  
Ou  
**S.A. ALCON COUVREUR N.V.**  
RIJKSWEG 14  
B 2870 PUURS  
BELGIQUE  
Ou  
**ALCON LABORATORIES BELCO**  
LICHTERVELD 3  
2870 PUURS-SINT-AMANDS  
BELGIQUE

Sans objet.

## [à compléter ultérieurement par le titulaire]

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).